



## Olimpiada Națională de Matematică

## Etapa Județeană/a Sectoarelor Municipiului București, 2026

## CLASA a VIII-a – soluții

Punctaj din oficiu ..... 10 p

**Problema 1.** a) Determinați numerele reale  $x$  pentru care numerele  $x + \sqrt{3}$  și  $3x^2 + \sqrt{3}$  sunt raționale.

b) Arătați că nu există niciun număr real  $y$  astfel încât numerele  $y + \sqrt{3}$  și  $3y^2 + y^3 + \sqrt{3}$  să fie raționale.

*Soluție.* a) Din  $x + \sqrt{3} = a \in \mathbb{Q}$  rezultă  $x = a - \sqrt{3}$  și astfel  $3x^2 + \sqrt{3} = 3(a - \sqrt{3})^2 + \sqrt{3} = 3a^2 + 9 + \sqrt{3} \cdot (1 - 6a)$  ..... **3p**

Numărul  $3x^2 + \sqrt{3}$  este rațional dacă și numai dacă  $1 - 6a = 0$ , adică  $a = \frac{1}{6} \in \mathbb{Q}$ . ..... **3p**

Există, așadar, un singur număr real care verifică enunțul, anume  $x = \frac{1}{6} - \sqrt{3}$ . ..... **1,5p**

b) Presupunem că există  $y \in \mathbb{R}$  cu  $y + \sqrt{3} = a \in \mathbb{Q}$  și  $3y^2 + y^3 + \sqrt{3} = b \in \mathbb{Q}$ . ..... **3p**

Deducem că  $y = a - \sqrt{3}$  și astfel  $b = 3(a - \sqrt{3})^2 + (a - \sqrt{3})^3 + \sqrt{3} = 3a^2 + 9 + \sqrt{3} \cdot (1 - 6a) + a^3 - 3a^2\sqrt{3} + 9a - 3\sqrt{3} = \underbrace{a^3 + 3a^2 + 9a + 9}_{\in \mathbb{Q}} + \sqrt{3} \cdot (-3a^2 - 6a - 2) \in \mathbb{Q}$ . ..... **6p**

Rezultă  $3a^2 + 6a + 2 = 0$ , de unde  $a = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{3} \notin \mathbb{Q}$ , deci presupunerea este falsă. .... **6p**

**Problema 2.** Arătați că numărul  $\sqrt{(\overline{xxx} - y)^2 + (\overline{yyy} - x)^2}$  este irațional, oricare ar fi cifrele distincte nenule  $x$  și  $y$ .

*Gazeta Matematică*

*Soluție.* Notăm  $A = (\overline{xxx} - y)^2 + (\overline{yyy} - x)^2$ . Arătăm că  $A$  nu este pătrat perfect.

La împărțirea unui pătrat perfect la 11 se poate obține restul 0, 1, 3, 4, 5 sau 9, (\*) .... **6p**

Avem  $(\overline{xxx} - y)^2 = (111x - y)^2 = (110x + x - y)^2 = (M_{11} + x - y)^2 = M_{11} + (x - y)^2$  ..... **3p**

Analog,  $(\overline{yyy} - x)^2 = M_{11} + (y - x)^2$ , deci  $A = (\overline{xxx} - y)^2 + (\overline{yyy} - x)^2 = M_{11} + 2(x - y)^2$  **3p**

Din (\*) rezultă că  $A \in \{M_{11}, M_{11} + 2, M_{11} + 6, M_{11} + 7, M_{11} + 8, M_{11} + 10\}$  ..... **6p**

Cum  $x \neq y$ , rezultă că  $A \neq M_{11}$ , deci prin împărțirea lui  $A$  la 11 se pot obține doar resturile 2, 6, 7, 8 sau 10, iar din (\*) rezultă că  $A$  nu este pătrat perfect ..... **3p**


Ca urmare,  $\sqrt{A} = \sqrt{(\overline{xxx} - y)^2 + (\overline{yyy} - x)^2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . ..... **1,5p**

**Problema 3.** Fie  $ABCA'B'C'$  o prismă triunghiulară regulată,  $M, N, P$  mijloacele muchiilor  $AB, CC'$ , respectiv  $A'C'$  și punctul  $Q$  pe muchia  $BC$ , astfel încât  $AB = 18$  cm,  $AA' = 3\sqrt{3}$  cm și  $BQ = 10$  cm.

a) Arătați că  $AB \perp (CMC')$ .

b) Arătați că dreptele  $MN$  și  $PQ$  sunt perpendiculare.

*Soluție.* a) Cum triunghiul  $ABC$  este echilateral și  $M$  este mijlocul lui  $AB$ , obținem  $CM \perp AB$ . Din  $C'C \perp (ABC)$ ,  $AB \subset (ABC)$ , deducem  $C'C \perp AB$  și cum  $CM, C'C$  sunt drepte concurente din planul  $(CMC')$ , deducem  $AB \perp (CMC')$ . ..... **6p**



b) Fie  $P'$  mijlocul lui  $B'C'$ ,  $M'$  mijlocul lui  $A'B'$ ,  $C'M' \cap PP' = \{S'\}$ ,  $QQ' \parallel AB$ ,  $Q'$  pe muchia  $AC$  și  $CM \cap QQ' = \{S\}$ .

Cum  $PQ \subset (QP'P)$ , este suficient să arătăm că  $MN \perp (QP'P)$ . Din  $AB \perp (CMC')$ , avem  $AB \perp NM$  și cum  $QQ' \parallel AB$ , obținem  $MN \perp QQ'$ . ..... **3p**

Vom arăta că  $SS' \perp MN$  și pentru aceasta, că patrulaterul  $MSNS'$  este ortodiagonal. Cum  $NC' = NC$  și  $S'C' = M'S'$ , avem:  $MS^2 + S'N^2 = SN^2 + MS'^2 \Leftrightarrow MS^2 + S'C'^2 + C'N^2 = SC^2 + NC^2 + MM'^2 + M'S'^2 \Leftrightarrow MS^2 = SC^2 + MM'^2$ . ..... **6p**

Dar  $CM = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$  cm și  $\frac{MS}{CM} = \frac{BQ}{BC} \Rightarrow \frac{MS}{9\sqrt{3}} = \frac{10}{18} \Rightarrow MS = 5\sqrt{3}$  cm, de unde  $SC = 4\sqrt{3}$  cm și cum  $MM' = 3\sqrt{3}$  cm, avem  $MS^2 = SC^2 + MM'^2 \Leftrightarrow (5\sqrt{3})^2 = (4\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2$ , relație adevărată. Obținem, astfel, că patrulaterul  $MSNS'$  este ortodiagonal, deci  $MN \perp SS'$  și cum  $MN \perp QQ'$ , rezultă  $MN \perp (PP'Q)$  ..... **6p**

Așadar,  $MN \perp PQ$ . ..... **1,5p**

**Problema 4.** Un cub cu latura de lungime  $\ell \in \mathbb{R}$ ,  $\ell > 0$ , este împărțit în 297 de cuburi, dintre care unul are latura de lungime  $x$ ,  $x \neq 1$ , și restul au latura de lungime 1.

a) Arătați că  $\ell \in \mathbb{N}$ .

b) Determinați valoarea numărului  $\ell$ .

*Soluție.* a) Cuburile în care este împărțit cubul cu latura  $\ell$  au fețele paralele cu fețele acestuia.

Fie  $d$  o dreaptă care intersectează cubul mare, paralelă cu o muchie a cubului, care nu intersectează cubul de latură  $x$ , atunci  $d$  va intersecta cubul mare după un segment  $MN = \ell$  și  $a, a \in \mathbb{N}^*$ , cuburi de latură 1, deci  $\ell = a \cdot 1 \in \mathbb{N}^*$ . ..... **6p**

b) Considerând o dreaptă  $d'$  paralelă cu o muchie a cubului mare, care intersectează cubul de latură  $x$ , atunci  $\ell = x + k \cdot 1, k \in \mathbb{N}$  și de aici  $x \in \mathbb{N}^*$ . ..... **3p**

Egalând volumele, obținem  $\ell^3 = x^3 + 296 \Leftrightarrow (\ell - x)(\ell^2 + \ell \cdot x + x^2) = 2^3 \cdot 37$ , unde  $\ell, x \in \mathbb{N}^*, x \neq 1$ . ..... **3p**

Pentru  $x = 2$ , obținem  $\ell^3 = 304$ , care nu are soluții naturale, deoarece  $6^3 = 216 < 304 < 343 = 7^3$ , deci  $x \geq 3$ . Dacă  $\ell - x \geq 4 \Rightarrow 296 = \ell^3 - x^3 \geq (x+4)^3 - x^3 = 12x^2 + 48x + 64 > 296$  pentru  $x \geq 3$ , deci nu avem soluție. .... **3p**

Deci  $\ell - x \mid 2^3 \cdot 37$  și  $\ell - x \leq 3 \Rightarrow \ell - x \in \{1, 2\}$ . Dacă  $\ell - x = 1 \Rightarrow (x+1)^3 = x^3 + 296 \Rightarrow 3x^2 + 3x = 295$  care nu are soluții în  $\mathbb{N}$ . .... **3p**

Dacă  $\ell - x = 2 \Rightarrow (x+2)^3 = x^3 + 296 \Leftrightarrow 6x^2 + 12x = 288 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 48 \Leftrightarrow (x+1)^2 = 49$ , deci  $x = 6$ , de unde  $\ell = 8$ . .... **4,5p**